

メニエール病

メニエール病の症状

1. めまい。
2. はきけ・はく。
3. 耳鳴り。
4. 難聴。

メニエール病の治療

1. 安静
2. 内服薬、点滴
3. 精神的な疲労、ストレスをさけ、睡眠を十分にとるように気をつけてください。
4. 禁煙
5. 重症な場合は手術

メニエール病のめまいは、軽い発作から、立ってられない程の強い発作までいろいろとあります。

メニエール病のめまいは、長くても数時間でおさまります。

激しいめまいの発作時には、めまいが永遠に続くのではないかという不安に、おそわれますが、メニエール病のめまいは、時間がたてばかならず消え去ります。めまいの嵐が去るまで、じっと寝ていてください。

メニエール病は命にかかわる病気ではありません。

車の運転には気をつけて下さい。

遊園地などの、ぐるぐる回る乗物には乗らないで下さい。

一度、耳鼻科的な精密検査を受ける必要があります。

脳神経科の検査を受ける必要な場合もあります。

矢野耳鼻咽喉科	藤沢市善行 1-25-11	8 1	3 5 4 1
医学博士	日本耳鼻咽喉科学会専門医	矢野	潮
	日本耳鼻咽喉科学会専門医	矢野	ゆかり
	日本耳鼻咽喉科学会専門医	矢野	さゆり