

突発性難聴

あなたの病気は、突発性難聴の疑いがあります。以下、突発性難聴について説明いたします。

突発性難聴とは、突然におこる原因不明の高度の難聴の事をいいます。

耳鳴のみを自覚して、難聴に気がつかない事もあります。

耳鳴も自覚せず、“耳がつまったような感じ”だけの事もあります。

突発性難聴は、一日も早く（1週間以内に）治療を開始する事が必要です。

突発性難聴は、治療開始が2週間以上たつと治りにくいといわれています。

“めまい”をともなう突発性難聴は原則として治りにくいといわれています。

高い音が聞こえない突発性難聴は原則として治りにくいといわれています。

低い音が聞こえない突発性難聴は比較的治りやすいといわれています。

突発性難聴は、次のように治療します。

薬物療法。

安静。

必要な場合は、入院設備のある病院（市民病院・大学病院等）に、入院して、薬物療法・点滴・高圧酸素療法等による治療をおこないます。

突発性難聴は治療をおこなっても、難聴と耳鳴りが治らない事もあります。

突発性難聴と鑑別する必要がある病気に聴神経腫瘍があります。

脳神経外科的な精密検査が必要です。

矢野耳鼻咽喉科 医学博士	藤沢市善行 1-25-11 日本耳鼻咽喉科学会専門医 日本耳鼻咽喉科学会専門医 日本耳鼻咽喉科学会専門医	8 1 矢野 矢野 矢野	3 5 4 1 潮 ゆかり さゆり
-----------------	---	-----------------------	----------------------------