

急性低音障害型感音難聴

急性におこり、原因が不明。ストレス、睡眠不足が誘引とされています。

患者さん自身は、聴力が悪くなっている事に気がついていない事が多い様です。

耳の不快感・耳の閉塞感、耳の中に水が流れているような感じがします。

聴力検査をすると、毎日のように聴力の変動(良くなったり、悪くなったり)があります。

1 2 5 H z 、 2 5 0 H z 、 5 0 0 H z の聴力低下の合計が、1 0 0 d b 以上を病的とします。あなたの今日の聴力は、

1 2 5 H z d b . 2 5 0 H z d b . 5 0 0 H z d b
合計 d b です。

2 ~ 3 ヶ月経過を観察する必要があります。

一度治っても、再発する危険性があります。

多くの場合は、聴力が快復して終わりますが、聴力が快復しない事もあります。

治療方法。

ステロイド剤 (副作用があるので重症例にのみ使用)。

アデホス (粉薬)

ビタミン B 1 2

イソバイド (水薬)。まずいけれども我慢して飲む事が重要です。

普通の治療で治らない場合は、入院が必要なこともあります。

生活上気をつける事。

ストレスをさけてください。

大きな音を聞かない様にしてください。

睡眠を十分にとってください。

聴力検査はくり返して行う必要があります。

矢野耳鼻咽喉科	藤沢市善行 1-25-11	8 1	3 5 4 1
医学博士	日本耳鼻咽喉科学会専門医	矢野	潮
	日本耳鼻咽喉科学会専門医	矢野	ゆかり
	日本耳鼻咽喉科学会専門医	矢野	さゆり