

# 扁桃周囲炎・扁桃周囲膿瘍

扁桃腺炎がひどくなり扁桃腺のまわりまで、炎症がすすんだ状態を扁桃周囲炎といいます。  
扁桃周囲炎がさらにすすんで、化膿すると扁桃周囲膿瘍になります。

扁桃腺炎 扁桃周囲炎 扁桃周囲膿瘍

## 症状

扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍ともに多くの場合、片側になります。

普通の扁桃腺炎より痛みが強く、食事がとれなくなります。

のどの痛みが耳にひびいて、耳に激しい痛みを感じることもあります。

熱も高くなり、体のふしづしが痛くなることもあります。

## 治療

抗生物質の内服。

耳鼻咽喉科的なのどの処置、ネブライザー（吸入）。

食事がとれないばあいは、入院の上、栄養剤と抗生物質の点滴が必要になります。

化膿したときは切開が必要になります。（入院5日くらい）。

## 日常生活の注意

約2週間は安静が必要です。

食事はできれば消化のよいものを食べ、水分を十分にとってください。

入浴、喫煙、飲酒は禁止です。

扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を2回以上くりかえす時は、根本的に扁桃腺をとる手術が必要になります。扁桃腺の手術は原則として、炎症のない体調のよい時におこないます。

**のどが痛くなったら一日も早く、耳鼻咽喉科専門医の診察を受けることが必要です。**

注意 糖尿病のかたは、化膿がひどくなることがあります。必ずお申しいでください。

矢野耳鼻咽喉科 医学博士	藤沢市善行 1-25-11	8 1 3 5 4 1
	日本耳鼻咽喉科学会専門医	矢野 潮
	日本耳鼻咽喉科学会専門医	矢野 ゆかり
	日本耳鼻咽喉科学会専門医	矢野 さゆり